



# Nº 351 – DADOS “IN SITU” DE PORCOS CARUNCHO NA MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE



**Marson Bruck Warpechowski**(1\*); Kaline Alessandra Lima de Sá(1); Juliana Sperotto Brum(1); Antônio Luciano de Souza(2); Ugo Gutierrez Neto(3); Tiago Francisco Alves(3); Giovana Capra Dessuy(1); Sergio José da Cruz(1)  
(1)Universidade Federal do Paraná. (2)Coletivo Triunfo. (3)Grupo de Criadores Carunchos do Sul. \*marson@ufpr.br

## OBJETIVOS

Sistematizar e registrar as informações dos porcos Caruncho de núcleo de criadores “in situ” da mesorregião Sudeste Paranaense

## MATERIAL E MÉTODOS

Por demanda dos próprios criadores ao Projeto Porco Moura e com apoio do Coletivo Triunfo, foi dada orientação para conservação e boas práticas na criação tradicional, por atendimento presencial e remoto. Entre 2018 e 2021 o rebanho existente foi examinado e classificado em linhagens com base no relato da origem e histórico individual, orientando para manejo sanitário, reprodutivo e alimentar, bem estar animal, registro zootécnico, controle genealógico, e seleção pelo padrão racial. Seis criadores fundaram o grupo Carunchos do Sul, dos quais apresentamos os resultados iniciais.



## RESULTADOS

### Plantel inicial (2019)

9 criadores/50 porcos  
14 machos (9 linhas)  
36 fêmeas (20 linhas)



### Após seleção (2021)

6 criadores/36 porcos  
9 machos (9 linhas)  
27 fêmeas (20 linhas)



Registros de 16 porcas da raça Caruncho, com até 4 ordens de parto

Parâmetros	Média ± DP	N <sup>1</sup>	Máx.	Mín.
Nascidos totais	6,41 ± 1,98	32	11	3
Nascidos vivos	6,00 ± 2,12	32	11	2
Peso nasc. vivos (kg)	0,750 ± 0,157	11	1006	545
Vivos aos 21 dias	5,28 ± 2,14	32	9	1
Peso aos 21 dias (kg)	2,71 ± 0,869	9	4,03	1,78
Idade ao desmame (d)	50,0 ± 7,4	29	69	45
Desmamados	5,19 ± 2,18	32	9	1
Peso ao desmame (kg)	5,73 ± 2,12	7	9,05	3,60
Mortalidade 21 dias (%)	11,98 ± 0,22	32	0,86	0,0
Mortalid. desmame (%)	13,54 ± 0,22	32	0,86	0,0



Padrão selecionado: porte pequeno, tipo banha, com pelos, oveis, focinho curto, perfil fronto-nasal concavilíneo, orelhas asiáticas pequenas, >= 10 tetas

## CONCLUSÃO

Os resultados promissores da da raça Caruncho no Sudeste Paranaense demonstram que é possível a conservação “in situ” das raças crioulas em risco de extinção desde que os criadores tenham acesso à orientação técnica adequada e lhes seja permitido o fluxo genético entre criadores para evitar endogamia

## AGRADECIMENTOS

Bolsa de doutorado CAPES